



Laxin

Zur Unterstützung des Kotabsatzes.

Zur Unterstützung der Verdauung, der Kotscheidung und der Ammoniakausscheidung über den Kot. Laxin reguliert die Kotkonsistenz.

Laxin kann die Verdauung und Entgiftung unterstützen, indem es die Wasserzufuhr im Darm osmotisch erhöht, was die Verdauung fördert und der Verstopfung vorbeugen kann. Zusätzlich fördert es die Ausscheidung von Toxinen über den Stuhlgang, indem es den pH-Wert im Dickdarm senkt und die Darmpassagezeit verkürzt.

Laxin ist in Pulverform erhältlich. Dies erleichtert die Anmischung und das Mitführen auf Reisen.

Produktart

Einzelfuttermittel für Katzen und Hunde

Nettofüllmenge

60 / 170g Pulver

Inhaltsstoffe

Lactulose

Analytische Bestandteile

Rohprotein (< 0,3%), Rohasche (< 0,4%), Rohfaser (< 0,5%), Rohfett (< 0,3%), Feuchtigkeit (3,9%)

Anwendung

Die angegebene Pulvermenge mit dem Dosierlöffel abmessen und mit der vorgeschriebenen Wassermenge vermischen. Die Mischung mit der beiliegenden Spritze aufziehen. Laxin kann direkt verfüttert oder unter das Futter gemischt werden.

Die Restmenge/Der Rest kann verworfen oder im Kühlschrank gelagert und am folgenden Tag verfüttert werden.

Tägliche Anwendungsempfehlung

Bei auftretendem Durchfall Fütterung abbrechen und mit geringerer Fütterungsmenge erneut starten.

Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.

Tägliche Fütterungsempfehlung

| | Wassermenge | 1 x täglich |
|---|-------------|-------------|
| 1kg | 0,75ml | 0,5 x |
| 2-3kg | 2,25ml | 1 x |
| 4-7kg | 4,5ml | 2 x |
| 8-11kg | 6,75ml | 3 x |
| 12-14kg | 9ml | 4 x |
| 15-18kg | 11,25ml | 5 x |
| 19-22kg | 13,5ml | 6 x |
| 23-26kg | 15,75ml | 7 x |
| 27-30kg | 18ml | 8 x |
| 31-33kg | 20,25ml | 9 x |
| 34-37kg | 22,5ml | 10 x |
| 38-40kg | 24,75ml | 11 x |
| 1 x (gestrichener Dosierlöffel) \approx ca. 1,5g | | |

Halbbarkeitshinweise

Nicht über 25°C lagern.

Nach dem Öffnen innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

Nach dem Öffnen das Pulver zügig entnehmen und die Dose wieder fest verschließen.

Packung fest verschlossen und trocken lagern.

Hinweise

Nicht anwenden bei vollständigem Magen-Darm-Verschluss, Darmperforation oder dem Risiko für eine Darmperforation.

Füllhöhe technisch bedingt.

Made in Germany.

Inhaltsstoffe

Lactulose

Lactulose ist ein Zweifachzucker, der im Darm von Bakterien abgebaut wird. Dieser Abbauprozess kann eine abführende Reaktion auslösen. Lactulose kann die Kotscheidung unterstützen, indem sie den Wassereinstrom in den Darm erhöht. Das kann zu einem erhöhten Kotvolumen führen, was wiederum die Darmperistaltik anregen kann. Dadurch kann die Kotscheidung unterstützt, verbessert und erleichtert werden. Zusätzlich dazu kann die gesteigerte Wasseraufnahme im Darm dazu beitragen, die Verweildauer von Toxinen und Giftstoffen im Darm zu reduzieren und die Aufnahme schädlicher Substanzen in den Körper zu verringern. Lactulose kann ebenfalls zu einer Senkung des pH-Wertes im Darm führen. Diese pH-Senkung kann die Ausscheidung von Ammoniak über den Darm erhöhen.

Jetzt bestellen -
exklusiv für
Tierarztpraxen
und Kliniken



WEB inuvet.verf bestellen.com
WEB ch.vetpoint.ch
EMAIL bestellung@inuvet.com
WHATSAPP +49 175 8063369



DE Inuвет GmbH
Bernier Weg 7-25
D-79539 Lörnach
TEL +49 7621 5791510
FAX +49 7621 5791512

AT Inuвет GmbH
Bürgergasse 11
AT-8330 Faldbach
TEL +43 720 816828
FAX +43 720 230795

CH Inuвет AG
Grabenstrasse 15a
CH-6340 Baar ZG
TEL +41 41 5880646
FAX +41 41 5880622

@inuvet_tiergesundheits
@inuvet.de
facebook.com/inuvet.de